

ALBERTINO

SORTENPASS | DINKEL
ZÜCHTER | VERTRIEB | DR. ALTER

TYP | KORNDICHTETYP
ZULASSUNG | 2019

NUTZUNGSEIGNUNG



BESONDERE STANDORTEIGNUNG




AUSSAATZEITRAUM

**MITTLERE AUSSAATSTÄRKE | ENTSPELZT: 250 KÖRNER/M²;
 NICHT ENTSPELZT: 120-140 VESEN/M²**



ANBAUINDEX



EINSTUFUNG IN ANLEHNUNG AN DIE BESCHREIBENDE SORTENLISTE

	+	1	2	3	4	5	6	7	8	9	-	
Reife		█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	5
Mehltau		█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	8
Blattseptoria		█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	4
Drechslera tritici-repentis	keine Einstufung											
Gelbrost		█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	4
Braunrost		█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	7

BESONDERHEITEN

Sehr gute Qualitäts- und Backeigenschaften
Auf Mehltau und Braunrost achten

BADENSONNE

SORTENPASS | DINKEL
ZÜCHTER | VERTRIEB | HS

TYP | KORNDICHTETYP
ZULASSUNG | 2016

NUTZUNGSEIGNUNG



BESONDERE STANDORTEIGNUNG




AUSSAATZEITRAUM

**MITTLERE AUSSAATSTÄRKE | ENTSPELZT: 250 KÖRNER/M²;
 NICHT ENTSPELZT: 120-140 VESEN/M²**



ANBAUINDEX



EINSTUFUNG IN ANLEHNUNG AN DIE BESCHREIBENDE SORTENLISTE

	+	1	2	3	4	5	6	7	8	9	-	
Reife		█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	6
Mehltau		█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	7
Blattseptoria		█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	4
Drechslera tritici-repentis	keine Einstufung											
Gelbrost		█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	4
Braunrost		█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	7

BESONDERHEITEN

Gute Standfestigkeit
Auf Mehltau und Braunrost achten

FRANCKENTOP

SORTENPASS | DINKEL
ZÜCHTER | VERTRIEB | PZO

TYP | KORNDICHTETYP
ZULASSUNG | 2021

NUTZUNGSEIGNUNG



BESONDERE STANDORTEIGNUNG




AUSSAATZEITRAUM

**MITTLERE AUSSAATSTÄRKE | ENTSPELZT: 250 KÖRNER/M²;
 NICHT ENTSPELZT: 120-140 VESEN/M²**



ANBAUINDEX



EINSTUFUNG IN ANLEHNUNG AN DIE BESCHREIBENDE SORTENLISTE

	+	1	2	3	4	5	6	7	8	9	-
Reife	█									5	
Mehltau	█										7
Blattseptoria	█									4	
Drechslera tritici-repentis	keine Einstufung										
Gelbrost	keine Einstufung										
Braunrost	█										5

BESONDERHEITEN

Sehr hohe Fallzahlen mit Spitzenqualität
Auf Mehltau achten

HOHENLOHER

SORTENPASS | DINKEL
ZÜCHTER | VERTRIEB | PZO

TYP | BESTANDESDICHTENTYP
ZULASSUNG | 2016

NUTZUNGSEIGNUNG



BESONDERE STANDORTEIGNUNG




AUSSAATZEITRAUM

**MITTLERE AUSSAATSTÄRKE | ENTSPELZT: 250 KÖRNER/M²;
 NICHT ENTSPELZT: 120-140 VESEN/M²**



ANBAUINDEX



EINSTUFUNG IN ANLEHNUNG AN DIE BESCHREIBENDE SORTENLISTE

	+	1	2	3	4	5	6	7	8	9	-	
Reife	█									5		
Mehltau	█									5		
Blattseptoria	█									5		
Drechslera tritici-repentis	keine Einstufung											
Gelbrost	█											3
Braunrost	█									5		

BESONDERHEITEN

Hohe Erträge und gute Entspelzbarkeit
Auf Septoria und Braunrost achten

ZOLLERNFIT

SORTENPASS | DINKEL
ZÜCHTER | VERTRIEB | SU

TYP | KORNDICHTETYP
ZULASSUNG | 2020

NUTZUNGSEIGNUNG



BESONDERE STANDORTEIGNUNG




AUSSAATZEITRAUM

**MITTLERE AUSSAATSTÄRKE | ENTSPELZT: 250 KÖRNER/M²;
 NICHT ENTSPELZT: 120-140 VESEN/M²**



ANBAUINDEX



EINSTUFUNG IN ANLEHNUNG AN DIE BESCHREIBENDE SORTENLISTE

	+	1	2	3	4	5	6	7	8	9	-	
Reife	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	6
Mehltau	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	4
Blattseptoria	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	6
Drechslera tritici-repentis	keine Einstufung											
Gelbrost	keine Einstufung											
Braunrost	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	4

BESONDERHEITEN

Sehr gute Standfestigkeit; Sehr gute Mehl- und Backqualität
Auf Septoria achten

ZOLLERNPERLE

SORTENPASS | DINKEL
ZÜCHTER | VERTRIEB | SU

TYP | KORNDICHTETYP
ZULASSUNG | 2018

NUTZUNGSEIGNUNG



BESONDERE STANDORTEIGNUNG




AUSSAATZEITRAUM

**MITTLERE AUSSAATSTÄRKE | ENTSPELZT: 250 KÖRNER/M²;
 NICHT ENTSPELZT: 120-140 VESEN/M²**



ANBAUINDEX



EINSTUFUNG IN ANLEHNUNG AN DIE BESCHREIBENDE SORTENLISTE

	+	1	2	3	4	5	6	7	8	9	-	
Reife	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	5
Mehltau	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	3
Blattseptoria	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	5
Drechslera tritici-repentis	keine Einstufung											
Gelbrost	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	3
Braunrost	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	5

BESONDERHEITEN

Gute Unkrautunterdrückung
Auch für den ökologischen Anbau empfohlen