Getreideherbizide Herbst 2022

Behandlungsmöglichkeiten

#Produkte

#Wirkungsspektren

#Kombinationsmöglichkeiten

#Einsatzzeitpunkte

#kompakte Empfehlungen

Quelle: eigene Bilder.

SGL GmbH
Siedlerweg 21
50374 Erftstadt-Gymnich
T +49 (0)2235 95511 0
F +49 (0) 2235 95511 20
E kontakt@sgl-gmbh.de
www.sgl-gmbh.de

Alle Angaben ohne Gewähr. Empfehlungen verstehen sich in l, g oder kg je ha.

Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Bei der Anwendungen sind die gültigen Auflagen zu beachten.

Normalstandorte

Anwendung von Chlortoluron möglich unter Beachtung der NG 405: nicht auf drainierten Flächen einsetzen.
(bis 900 g/ha in allen Weizensorten möglich)

Wirkung: **XXX** = sehr gut und sicher (auch gegen toleranten/resistenten AFS und Windhalm), XXX = sehr gut, XX = gut, X = nicht ausreichend, o = keine

Beachte: gegen Kornblume und Hundskerbel ist CTU ein sehr hilfreicher Wirkstoff!

Zugelassen in Getreide-Arten ...
von **EC ..**
bis **EC ..**

l/ha oder kg/ha

Wirkstoffe wirken über: g/ha **BODEN** g/ha *Boden und Blatt* g/ha **BLATT**

Vom Vorauflauf bis zum 2. Blatt des Getreides

				A-fuchsschwanz	Windhalm	Einj. Rispe	Trespe	Weidelgras	Ehrenpreis	Gänsefuß/Melde	Hirtentäschel	Hohlzahn	Kamille	Klatschmohn	Klettenlabkraut	Knöterich	Kornblume	Rapsauflauf	Stiefmütterchen	Storchschnabel	Taubnessel	Vogelmiere
Profi CTU/Lentipur 1,0	**Herold SC** 0,5	*	G|R|W **00-13**; T **11-13**	XXX	**XXX**	XXX	o	Xx	XXX	XXX	XXx	XXX	XXX	XXx	XX	XX	X	XXX	XXX	Xx	XXX	XXX
					100	**Diflufenican**			200	**Flufenacet**			700	*Chlortoluron*								

˙ *Sortenverträglichkeit Weizen beachten*

Herold SC 0,4	**Trinity*** 1,5		G|R|W **00-13**; T **11-13**	XXX	**XXX**	XXX	o	X	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXx	XXx	XX	XXX	XXX	XX	XXX	**XXX**
					140	**Diflufenican**			160	**Flufenacet**			450	**Pendimethalin**			375	*Chlortoluron*				

*NW 800: keine Anwendung auf gedrainten Flächen zwischen dem 01.11 und 15.03

Pontos 0,5	**Trinity*** 1,5		G|T R|W **00-13**	XX	XXX	XXx	o	X	XXX	XXX	XXx	XXX	XXX	XXx	XXx	Xx	XXX	XX	XXX	XX	XXX	XXX
					60	**Diflufenican**			120	**Flufenacet**			375	*Chlortoluron*			50	*Picolinafen*				

*NW 800: keine Anwendung auf gedrainten Flächen zwischen dem 01.11 und 15.03

Ab dem 2. & 3. Blatt des Getreides

auf NG-Auflagen achten! **Carmina 640** 1,5	**Herold SC** 0,4	*	G|T W **10-13**	XXX	**XXX**	XXX	o	Xx	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXx	XXx	XXx	XX	XXX	XXX	XX	XXX	**XXX**
					140	**Diflufenican**			160	**Flufenacet**			900	*Chlortoluron*								

˙ *Sortenverträglichkeit Weizen beachten*

Profi CTU/Lentipur 2,5	**Stomp Aqua** 2,5	*	G|T W **11-29**	XXx	XXX	**XXX**	o	XX	XXX	XX	XX	XX	**XXX**	XXX	XX	XX	XX	X	XXX	X	XXX	XXX
	Activus SC 2,85		G|T|W **11-13**						1138	**Pendimethalin**			1750	*Chlortoluron*								

˙ *Sortenverträglichkeit Weizen beachten*

#beim Einsatz chlortoluron-haltiger Mittel ist in jedem Fall die Weizenverträglichkeit zu prüfen

#Anwendung von pendimethalin- und prosulfocarb-haltigen-Mitteln: NT145 ("300 l/ha Wasser") NT146 ("Fahrgeschwindigkeit > 7,5 km/h") NT170 ("Windgeschwindigkeit > 3 m/s")

Gegen Virusvektoren [Blattläuse und Zikaden beachten]: 0,150 Hunter WG oder 0,1 ShockDown (nur Weizen) oder systemisch 0,140 Teppeki (nur Gerste). Pyrethroide unbedingt ansäuern!

Problemstandorte

Chlortoluron wirkt nicht (Resistenz, Humus) oder darf nicht eingesetzt werden

Wirkung: **XXX** = sehr gut und sicher (auch gegen toleranten/resistenten AFS und Windhalm), XXX = sehr gut, XX = gut, X = nicht ausreichend, o = keine

Zugelassen in Getreide-Arten ...

von **EC ..**

bis **EC ..**

l/ha oder kg/ha

Wirkstoffe wirken über: g/ha **BODEN** g/ha *Boden und Blatt* g/ha **BLATT**

Vom Vorauflauf bis zum 2. Blatt des Getreides

			A-fuchsschwanz	Windhalm	Einj. Rispe	Trespe	Weidelgras	Ehrenpreis	Gänsefuß/Meld	Hirtentäschel	Hohlzahn	Kamille	Klatschmohn	Klettenlabkraut	Knöterich	Kornblume	Rapsauflauf	Stiefmütterchen	Storchschnabel	Taubnessel	Vogelmiere
FORTE SET		W T **VA**	XXX	**XXX**	XXX	x	x	XXX	XXX	XXx	XXX	XXx	XXx	XX	XX	X	XXX	XXx	XXX	XXX	XXX
0,7	0,5			350	**Aclonifen**			70	**Diflufenican**			250	**Flufenacet**								
Mateno Duo	**Cadou SC**																				
0,35	0,5	G|T R|W **10-13**	XXX	**XXX**	XXX	o	x	XXX	XXX	XXx	XXX	XX	XXx	XX	XX	X	XXX	XXx	XXX	XXX	XXX
FLEXI SET				175	**Aclonifen**			35	**Diflufenican**			250	**Flufenacet**								
		G R|W **VA**	XXX	**XXX**	XXx	x	XX	XXX	XXX	XXx	XXX	XXx	XXx	XXx	XXx	X	XXX	XXX	XXx	XXX	**XXX**
				78	**Diflufenican**			250	**Flufenacet**			39	*Picolinafen*								
Herold SC	**Pontos**																				
0,39	0,39	G|T R|W **10-13**	XXX	**XXX**	XX	o	Xx	XXX	XXX	XXx	XXX	XXx	XXx	XXx	XXx	X	XXX	XXX	XXx	XXX	**XXX**
				78	**Diflufenican**			250	**Flufenacet**			39	*Picolinafen*								
Boxer*	**Herold SC**	G R|W **00-12**	XXX	**XXX**	XXX	o	X	XXX	**XXX**	XXX	XXX	XX	XXx	XXx	XXx	Xx	XXx	XXX	X	XXX	XXX
3,0	0,6			120	**Diflufenican**			240	**Flufenacet**			2400	**Prosulfocarb**								

*WA706: nur in bis Ende Oktober gedrilltem Weizen anwenden

Bei bodenherbizidbetonten Spritzungen bis zu + 0,75 Fluw21 hinzusetzen, um die Wirkung besonders bei Trockenheit [Bodenfilm] und Verträglichkeit zu verbessern.

Ab dem 3. Blatt des Getreides

			A-fuchsschwanz	Windhalm	Einj. Rispe	Trespe	Weidelgras	Ehrenpreis	Gänsefuß/Meld	Hirtentäschel	Hohlzahn	Kamille	Klatschmohn	Klettenlabkraut	Knöterich	Kornblume	Rapsauflauf	Stiefmütterchen	Storchschnabel	Taubnessel	Vogelmiere
Pointer SX	**Herold SC**	G|T R|W **13**	XXX	**XXX**	XXX	o	X	XXX	XXX	**XXX**	XXX	**XXX**	XXx	XXx	XXx	XX	**XXX**	**XXX**	XX	XXX	**XXX**
(Trimmer SX)	in Triticale 0,5																				
0,015	0,6			120	**Diflufenican**			240	**Flufenacet**			7,5	*Tribenuron*								
Traxos	**Herold SC**	T R|W **13**	**XXX**	**XXX**	XX	x	XX	XXX	XXX	XXX	**XXX**	**XXX**	XXX	X	XX	XXx	XXX	**XXX**	XXx	**XXX**	XXX
0,9	0,5			100	**Diflufenican**			200	**Flufenacet**			23	**Clodinafop**			23	**Pinoxaden**				
Axial 50	**Stomp Aqua**	G|T R|W **13-29**	XXX	**XXX**	**XXX**	x	XX	XXX	XXX	XX	XXX	XXX	XXX	Xx	XX	XX	x	XXX	x	XXX	XXX
0,9	2,5							1138	**Pendimethalin**							45	**Pinoxaden**				

Gegen Virusvektoren [Blattläuse und Zikaden beachten]: 0,150 Hunter WG oder 0,1 ShockDown (nur Weizen) oder systemisch 0,140 Teppeki (nur Gerste). Pyrethroide unbedingt ansäuern!

Empfehlungen für den Herbst

einfache Allroundmischung

0,1 kg/ha sgl-Lignohumax AM top + 2,0 l/ha Trinity

#Schwerpunkt Windhalm

0,5 l/ha Pontos + 1,5 l/ha Trinity

0,5 l/ha Herold SC + 1,0 l/ha Profi CTU

Die höchsten Wirkungsgrade werden durch den frühzeitigen Einsatz [Vorauflauf] von Flufenacet erzielt!

#Schwerpunkt Ackerfuchsschwanz

gering bis mittel [tolerant]

0,4 l/ha Herold SC + 1,5 l/ha Trinity

mittel bis stark [Resistenzstatus unbekannt]

0,1 kg/ha sgl-Lignohumax AM top
+ 0,39 l/ha Herold SC + 0,39 l/ha Pontos
+ 10 kg/ha Schlemmkreide
[unmittelbar nach der Saat anzuwenden!]

Einwinterungs-empfehlung

0,5 kg/ha sgl-natrel top
+0,25 l/ha sgl-silizium pro
+ 0,5 l/ha sgl-CaB top

#keine Kompromisse im Herbst.
#Das PLUS für die Winterhärte, Vitalisierung u. zur Wirkungs-verbesserung der Insektizide.

sehr stark [Resistenz vorhanden]

0,6 l/ha Herold SC

SPRITZFOLGE

0,15 % Kantor + 1,2 l/ha Traxos
oder
0,15 % Kantor + 0,25 l/ha Sword 240 EC

Dinkel [Auswahl]

in Gerste/Dinkel
0,15 % Kantor + 0,9 l/ha Axial 50

3,0 l/ha Boxer

0,5 -0,6 l/ha Herold SC

Vorauflauf bis Spitzen	11	12	13	21	23
	1-	2-	3-	Beginn Bestockung	3 Bestockungs-triebe
		Blattstadium			

Diese Arbeitsunterlage dient ausschließlich der Information und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Alle Angaben wurden nach besten Wissen und Gewissen erarbeitet. Für etwaige Fehler wird keine Haftung übernommen. Wir können keine Gewährleistung für die Richtigkeit, insbesondere hinsichtlich der Zulassungssituation für Pflanzenschutzmittel, übernehmen. Die Anwendungen erfolgen auf eigenes Risiko. Bitte beachten Sie die jeweils neuesten Gebrauchsanleitungen der Pflanzenschutzmittel.