

AVANTASIA

SORTENPASS | WINTERGERSTE | MEHRZEILIG
ZÜCHTER | VERTRIEB | HS

TYP | EINZELÄHRENTYP
ZULASSUNG | 2022

NUTZUNGSEIGNUNG



BESONDERE STANDORTEIGNUNG




AUSSAATZEITRAUM


MITTLERE AUSSAATSTÄRKE | 300–350 KÖRNER/M²



ANBAUINDEX



EINSTUFUNG IN ANLEHNUNG AN DIE BESCHREIBENDE SORTENLISTE



BESONDERHEITEN

GMV Typ 1+2 resistent
Auf Zwergrost achten

Enthält eigene Einstufungen des Züchters

März 2022 | Stand

ESPRIT

SORTENPASS | WINTERGERSTE | MEHRZEILIG
ZÜCHTER | VERTRIEB | DSV

TYP | EINZELÄHRENTYP
ZULASSUNG | 2020

NUTZUNGSEIGNUNG



BESONDERE STANDORTEIGNUNG



AUSSAATZEITRAUM

MITTLERE AUSSAATSTÄRKE | 300–350 KÖRNER/M²



ANBAUINDEX

	0	1	3	5	7	9	
Marktwareanteil	[Progress bar from 0 to 9]						+
Hektolitergewicht	[Progress bar from 0 to 7]						+
Standfestigkeit	[Progress bar from 0 to 6]						+
Ährenstabilität	[Progress bar from 0 to 7]						+
Winterhärte	[Progress bar from 0 to 7]						+

EINSTUFUNG IN ANLEHNUNG AN DIE BESCHREIBENDE SORTENLISTE

	+	1	2	3	4	5	6	7	8	9	-	
Reife	[Green bars 1-6]											6
Mehltau	[Green bars 1-4]											4
Netzflecken	[Green bars 1-4]											4
Rhynchosporium	[Green bars 1-4]											4
Ramularia	[Green bars 1-4]											4
Zwergrost	[Green bars 1-6]											6

BESONDERHEITEN

Sehr hohe Erträge; Gutes hl-Gewicht; TOP Ertragsergebnisse - LSV 2020
Auf Zwergrost achten

JULIA

SORTENPASS | WINTERGERSTE | MEHRZEILIG
ZÜCHTER | VERTRIEB | DSV

TYP | EINZELÄHRENTYP
ZULASSUNG | 2022

NUTZUNGSEIGNUNG



BESONDERE STANDORTEIGNUNG



AUSSAATZEITRAUM

MITTLERE AUSSAATSTÄRKE | 300–350 KÖRNER/M²



ANBAUINDEX

	0	1	3	5	7	9	
Marktwareanteil	[Progress bar from 0 to 7]						+
Hektolitergewicht	[Progress bar from 0 to 5]						+
Standfestigkeit	[Progress bar from 0 to 8]						+
Ährenstabilität	[Progress bar from 0 to 7]						+
Winterhärte	[Progress bar from 0 to 7]						+

EINSTUFUNG IN ANLEHNUNG AN DIE BESCHREIBENDE SORTENLISTE

	+	1	2	3	4	5	6	7	8	9	-	
Reife	[Green bars 1-5]											5
Mehltau	[Green bars 1-4]											4
Netzflecken	[Green bars 1-4]											4
Rhynchosporium	[Green bars 1-5]											5
Ramularia	[Green bars 1-4]											4
Zwergrost	[Green bars 1-5]											5

BESONDERHEITEN

GMV Typ 1+2 resistent
Auf Zwergrost achten

Enthält eigene Einstufungen des Züchters

März 2022 | Stand

KWS EXQUIS

SORTENPASS | WINTERGERSTE | MEHRZEILIG
ZÜCHTER | VERTRIEB | KWS

TYP | KOMPENSATIONSTYP
ZULASSUNG | 2022

NUTZUNGSEIGNUNG



BESONDERE STANDORTEIGNUNG




AUSSAATZEITRAUM


MITTLERE AUSSAATSTÄRKE | 280–320 KÖRNER/M²



ANBAUINDEX



EINSTUFUNG IN ANLEHNUNG AN DIE BESCHREIBENDE SORTENLISTE



BESONDERHEITEN

Verzweigungs- + GMV1 resistent

KWS HIGGINS

SORTENPASS | WINTERGERSTE | MEHRZEILIG
ZÜCHTER | VERTRIEB | KWS

TYP | EINZELÄHRENTYP
ZULASSUNG | 2017

NUTZUNGSEIGNUNG



BESONDERE STANDORTEIGNUNG



AUSSAATZEITRAUM

MITTLERE AUSSAATSTÄRKE | 300–350 KÖRNER/M²



ANBAUINDEX

	0	1	3	5	7	9	
Marktwareanteil	[Progress bar from 0 to 9]						+
Hektolitergewicht	[Progress bar from 0 to 7]						+
Standfestigkeit	[Progress bar from 0 to 5]						+
Ährenstabilität	[Progress bar from 0 to 7]						+
Winterhärte	[Progress bar from 0 to 7]						+

EINSTUFUNG IN ANLEHNUNG AN DIE BESCHREIBENDE SORTENLISTE

	+	1	2	3	4	5	6	7	8	9	-
Reife	[Progress bar from 1 to 5]										5
Mehltau	[Progress bar from 1 to 4]										4
Netzflecken	[Progress bar from 1 to 4]										4
Rhynchosporium	[Progress bar from 1 to 5]										5
Ramularia	[Progress bar from 1 to 4]										4
Zwergrost	[Progress bar from 1 to 8]										8

BESONDERHEITEN

GMV Typ 1 resistent
Standfestigkeit absichern; Auf Zwergrost achten

KWS TONIC

SORTENPASS | WINTERGERSTE | MEHRZEILIG
ZÜCHTER | VERTRIEB | KWS

TYP | EINZELÄHRENTYP
ZULASSUNG | 2013

NUTZUNGSEIGNUNG



BESONDERE STANDORTEIGNUNG



AUSSAATZEITRAUM

MITTLERE AUSSAATSTÄRKE | 300–350 KÖRNER/M²



ANBAUINDEX

	0	1	3	5	7	9	
Marktwareanteil	[Progress bar from 0 to 7]						+
Hektolitergewicht	[Progress bar from 0 to 5]						+
Standfestigkeit	[Progress bar from 0 to 7]						+
Ährenstabilität	[Progress bar from 0 to 5]						+
Winterhärte	[Progress bar from 0 to 5]						+

EINSTUFUNG IN ANLEHNUNG AN DIE BESCHREIBENDE SORTENLISTE

	+	1	2	3	4	5	6	7	8	9	-
Reife	[Green bars 1-5]					[Grey bars 6-9]				5	
Mehltau	[Green bars 1-5]					[Grey bars 6-9]				5	
Netzflecken	[Green bars 1-5]					[Grey bars 6-9]				6	
Rhynchosporium	[Green bars 1-5]					[Grey bars 6-9]				6	
Ramularia	[Green bars 1-5]					[Grey bars 6-9]				5	
Zwergrost	[Green bars 1-5]					[Grey bars 6-9]				6	

BESONDERHEITEN

GMV Typ 1 resistent
Auf Rhynchosporium und Zwergrost achten

Enthält eigene Einstufungen des Züchters

März 2022 | Stand

KWS KOSMOS

SORTENPASS | WINTERGERSTE | MEHRZEILIG
ZÜCHTER | VERTRIEB | KWS

TYP | KORNDICHTETYP
ZULASSUNG | 2015

NUTZUNGSEIGNUNG



BESONDERE STANDORTEIGNUNG



AUSSAATZEITRAUM

MITTLERE AUSSAATSTÄRKE | 280–340 KÖRNER/M²



ANBAUINDEX

	0	1	3	5	7	9	
Marktwareanteil	[Progress bar to 9]						+
Hektolitergewicht	[Progress bar to 5]						+
Standfestigkeit	[Progress bar to 5]						+
Ährenstabilität	[Progress bar to 7]						+
Winterhärte	[Progress bar to 7]						+

EINSTUFUNG IN ANLEHNUNG AN DIE BESCHREIBENDE SORTENLISTE

	+	1	2	3	4	5	6	7	8	9	-
Reife	[Green]					[Grey]					5
Mehltau	[Green]				[Grey]						4
Netzflecken	[Green]				[Grey]						4
Rhynchosporium	[Green]				[Grey]						4
Ramularia	[Green]				[Grey]						4
Zwergrost	[Green]			[Grey]				[Green]			7

BESONDERHEITEN

GMV Typ 1 resistent
Auf Zwergrost achten

Enthält eigene Einstufungen des Züchters

März 2022 | Stand

KWS MEMPHIS

SORTENPASS | WINTERGERSTE | MEHRZEILIG
ZÜCHTER | VERTRIEB | KWS

TYP | EINZELÄHRENTYP
ZULASSUNG | 2020

NUTZUNGSEIGNUNG



BESONDERE STANDORTEIGNUNG




AUSSAATZEITRAUM


MITTLERE AUSSAATSTÄRKE | 300–350 KÖRNER/M²



ANBAUINDEX



EINSTUFUNG IN ANLEHNUNG AN DIE BESCHREIBENDE SORTENLISTE



BESONDERHEITEN

GMV Typ 1+2 resistent
Auf Mehltau und Zwergrost achten

KWS MORRIS

SORTENPASS | WINTERGERSTE | MEHRZEILIG
ZÜCHTER | VERTRIEB | KWS

TYP | KOMPENSATIONSTYP
ZULASSUNG | 2021

NUTZUNGSEIGNUNG



BESONDERE STANDORTEIGNUNG



AUSSAATZEITRAUM

MITTLERE AUSSAATSTÄRKE | 280–320 KÖRNER/M²



ANBAUINDEX

	0	1	3	5	7	9	
Marktwareanteil	[Progress bar from 0 to 7]						+
Hektolitergewicht	[Progress bar from 0 to 7]						+
Standfestigkeit	[Progress bar from 0 to 8]						+
Ährenstabilität	[Progress bar from 0 to 7]						+
Winterhärte	[Progress bar from 0 to 7]						+

EINSTUFUNG IN ANLEHNUNG AN DIE BESCHREIBENDE SORTENLISTE

	+	1	2	3	4	5	6	7	8	9	-
Reife	[Progress bar from 1 to 5]										5
Mehltau	[Progress bar from 1 to 3]										3
Netzflecken	[Progress bar from 1 to 4]										4
Rhynchosporium	[Progress bar from 1 to 4]										4
Ramularia	keine Einstufung										
Zwergrost	[Progress bar from 1 to 4]										4

BESONDERHEITEN GMV Typ 1 resistent

KWS ORBIT

SORTENPASS | WINTERGERSTE | MEHRZEILIG
ZÜCHTER | VERTRIEB | KWS

TYP | EINZELÄHRENTYP
ZULASSUNG | 2018

NUTZUNGSEIGNUNG



BESONDERE STANDORTEIGNUNG



AUSSAATZEITRAUM

MITTLERE AUSSAATSTÄRKE | 300–350 KÖRNER/M²



ANBAUINDEX

	0	1	3	5	7	9	
Marktwareanteil	[Progress bar from 0 to 7]						+
Hektolitergewicht	[Progress bar from 0 to 7]						+
Standfestigkeit	[Progress bar from 0 to 5]						+
Ährenstabilität	[Progress bar from 0 to 7]						+
Winterhärte	keine Einstufung						

EINSTUFUNG IN ANLEHNUNG AN DIE BESCHREIBENDE SORTENLISTE

	+	1	2	3	4	5	6	7	8	9	-
Reife	[Green bars 1-5]					[Grey bars 6-9]				5	
Mehltau	[Green bars 1-5]					[Grey bars 6-9]				5	
Netzflecken	[Green bars 1-5]					[Grey bars 6-9]				5	
Rhynchosporium	[Green bars 1-5]					[Green bar 6]	[Grey bars 7-9]				6
Ramularia	[Green bars 1-5]					[Grey bars 6-9]				5	
Zwergrost	[Green bars 1-5]					[Green bar 6]	[Grey bars 7-9]				6

BESONDERHEITEN

GMV Typ 1 resistent
Auf Rhynchosporium und Zwergrost achten

QUADRIGA

SORTENPASS | WINTERGERSTE | MEHRZEILIG
ZÜCHTER | VERTRIEB | SEC

TYP | EINZELÄHRENTYP
ZULASSUNG | 2014

NUTZUNGSEIGNUNG




BESONDERE STANDORTEIGNUNG




AUSSAATZEITRAUM


MITTLERE AUSSAATSTÄRKE | 300–350 KÖRNER/M²



ANBAUINDEX



EINSTUFUNG IN ANLEHNUNG AN DIE BESCHREIBENDE SORTENLISTE



BESONDERHEITEN

GMV Typ 1 resistent
Auf Zwergrost achten

Enthält eigene Einstufungen des Züchters

März 2022 | Stand

SU ELLEN

SORTENPASS | WINTERGERSTE | MEHRZEILIG
ZÜCHTER | VERTRIEB | SU

TYP | EINZELÄHRENTYP
ZULASSUNG | 2014

NUTZUNGSEIGNUNG




BESONDERE STANDORTEIGNUNG



AUSSAATZEITRAUM

MITTLERE AUSSAATSTÄRKE | 300–350 KÖRNER/M²



ANBAUINDEX

	0	1	3	5	7	9	
Marktwareanteil	[Progress bar from 0 to 9]						+
Hektolitergewicht	[Progress bar from 0 to 5]						+
Standfestigkeit	[Progress bar from 0 to 7]						+
Ährenstabilität	[Progress bar from 0 to 5]						+
Winterhärte	[Progress bar from 0 to 6]						+

EINSTUFUNG IN ANLEHNUNG AN DIE BESCHREIBENDE SORTENLISTE

	+	1	2	3	4	5	6	7	8	9	-
Reife	[Green bars 1-4]				[Grey bars 5-9]					4	
Mehltau	[Green bars 1-4]				[Grey bars 5-9]					4	
Netzflecken	[Green bars 1-4]				[Grey bars 5-9]					4	
Rhynchosporium	[Green bars 1-4]				[Green bar 5]	[Grey bars 6-9]				5	
Ramularia	[Green bars 1-4]				[Green bar 5]	[Grey bars 6-9]				5	
Zwergrost	[Green bars 1-4]				[Green bar 5]	[Green bar 6]	[Green bar 7]	[Grey bars 8-9]			7

BESONDERHEITEN

GMV Typ 1+2 resistent
Auf Zwergrost achten

SU MIDNIGHT

SORTENPASS | WINTERGERSTE | MEHRZEILIG
ZÜCHTER | VERTRIEB | SU

TYP | KOMPENSATIONSTYP
ZULASSUNG | 2021

NUTZUNGSEIGNUNG



BESONDERE STANDORTEIGNUNG



AUSSAATZEITRAUM

MITTLERE AUSSAATSTÄRKE | 280–320 KÖRNER/M²



ANBAUINDEX

	0	1	3	5	7	9	
Marktwareanteil	[Progress bar from 0 to 7]						+
Hektolitergewicht	[Progress bar from 0 to 5]						+
Standfestigkeit	[Progress bar from 0 to 8]						+
Ährenstabilität	[Progress bar from 0 to 5]						+
Winterhärte	[Progress bar from 0 to 7]						+

EINSTUFUNG IN ANLEHNUNG AN DIE BESCHREIBENDE SORTENLISTE

	+	1	2	3	4	5	6	7	8	9	-
Reife	[Progress bar from 1 to 5]										5
Mehltau	[Progress bar from 1 to 3]										3
Netzflecken	[Progress bar from 1 to 5]										5
Rhynchosporium	[Progress bar from 1 to 6]										6
Ramularia	keine Einstufung										
Zwergrost	[Progress bar from 1 to 4]										4

BESONDERHEITEN

GMV Typ 1+2 resistent
Auf Rhynchosporium achten

TEUTO

SORTENPASS | WINTERGERSTE | MEHRZEILIG
ZÜCHTER | VERTRIEB | SEC

TYP | KORNDICHTETYP
ZULASSUNG | 2020

NUTZUNGSEIGNUNG



BESONDERE STANDORTEIGNUNG



AUSSAATZEITRAUM

MITTLERE AUSSAATSTÄRKE | 280-340 KÖRNER/M²



ANBAUINDEX

	0	1	3	5	7	9	
Marktwareanteil	[Progress bar to 7]						+
Hektolitergewicht	[Progress bar to 7]						+
Standfestigkeit	[Progress bar to 5]						+
Ährenstabilität	[Progress bar to 6]						+
Winterhärte	[Progress bar to 8]						+

EINSTUFUNG IN ANLEHNUNG AN DIE BESCHREIBENDE SORTENLISTE

	+	1	2	3	4	5	6	7	8	9	-	
Reife	[Green bars 1-6]											6
Mehltau	[Green bars 1-4]											4
Netzflecken	[Green bars 1-5]											5
Rhynchosporium	[Green bars 1-4]											4
Ramularia	[Green bars 1-4]											4
Zwergrost	[Green bars 1-3]											3

BESONDERHEITEN

GMV Typ 1 resistent
Standfestigkeit absichern