

BIANCA

SORTENPASS | WINTERGERSTE | ZWEIZEILIG
ZÜCHTER | VERTRIEB | IGP

TYP | KOMPENSATIONSTYP
ZULASSUNG | 2020

NUTZUNGSEIGNUNG



BESONDERE STANDORTEIGNUNG



AUSSAATZEITRAUM

MITTLERE AUSSAATSTÄRKE | 280–320 KÖRNER/M²



ANBAUINDEX

	0	1	3	5	7	9	
Marktwareanteil	[Progress bar from 0 to 7]						+
Hektolitergewicht	[Progress bar from 0 to 8]						+
Standfestigkeit	[Progress bar from 0 to 7]						+
Ährenstabilität	[Progress bar from 0 to 7]						+
Winterhärte	keine Einstufung						

EINSTUFUNG IN ANLEHNUNG AN DIE BESCHREIBENDE SORTENLISTE

	+	1	2	3	4	5	6	7	8	9	-	
Reife	[Progress bar from 1 to 6]											6
Mehltau	[Progress bar from 1 to 5]											5
Netzflecken	[Progress bar from 1 to 4]											4
Rhynchosporium	[Progress bar from 1 to 4]											4
Ramularia	[Progress bar from 1 to 4]											4
Zwergrost	[Progress bar from 1 to 4]											4

BESONDERHEITEN

GMV Typ 1 resistent
Auf Mehltau achten

Enthält eigene Einstufungen des Züchters

März 2022 | Stand

CALIFORNIA

SORTENPASS | WINTERGERSTE | ZWEIZEILIG
ZÜCHTER | VERTRIEB | LG

TYP | BESTANDESDICHTETYP
ZULASSUNG | 2012

NUTZUNGSEIGNUNG



BESONDERE STANDORTEIGNUNG



AUSSAATZEITRAUM

MITTLERE AUSSAATSTÄRKE | 270–320 KÖRNER/M²



ANBAUINDEX

	0	1	3	5	7	9	
Marktwareanteil	[Progress bar from 0 to 7]						+
Hektolitergewicht	[Progress bar from 0 to 7]						+
Standfestigkeit	[Progress bar from 0 to 7]						+
Ährenstabilität	[Progress bar from 0 to 7]						+
Winterhärte	[Progress bar from 0 to 5]						+

EINSTUFUNG IN ANLEHNUNG AN DIE BESCHREIBENDE SORTENLISTE

	+	1	2	3	4	5	6	7	8	9	-	
Reife	[Green bars 1-6]											6
Mehltau	[Green bars 1-4]											4
Netzflecken	[Green bars 1-4]											4
Rhynchosporium	[Green bars 1-4]											4
Ramularia	[Green bars 1-5]											5
Zwergrost	[Green bars 1-4]											4

BESONDERHEITEN

GMV Typ 1 resistent
Auf Ramularia achten

KWS DONAU

SORTENPASS | WINTERGERSTE | ZWEIZEILIG
ZÜCHTER | VERTRIEB | KWS

TYP | BESTANDESDICHTETYP
ZULASSUNG | 2019

NUTZUNGSEIGNUNG



BESONDERE STANDORTEIGNUNG



AUSSAATZEITRAUM

MITTLERE AUSSAATSTÄRKE | 270–320 KÖRNER/M²



ANBAUINDEX

	0	1	3	5	7	9	
Marktwareanteil	[Progress bar from 0 to 9]						+
Hektolitergewicht	[Progress bar from 0 to 9]						+
Standfestigkeit	[Progress bar from 0 to 9]						+
Ährenstabilität	[Progress bar from 0 to 9]						+
Winterhärte	keine Einstufung						

EINSTUFUNG IN ANLEHNUNG AN DIE BESCHREIBENDE SORTENLISTE

	+	1	2	3	4	5	6	7	8	9	-	
Reife	[Green bars 1-5]											5
Mehltau	[Green bars 1-5]											5
Netzflecken	[Green bars 1-4]											4
Rhynchosporium	[Green bars 1-4]											4
Ramularia	[Green bars 1-5]											5
Zwergrost	[Green bars 1-4]											4

BESONDERHEITEN

GMV Typ 1 resistent
Auf Mehltau achten

Enthält eigene Einstufungen des Züchters

März 2022 | Stand

KWS MOSELLE

SORTENPASS | WINTERGERSTE | ZWEIZEILIG
ZÜCHTER | VERTRIEB | KWS

TYP | BESTANDESDICHTETYP
ZULASSUNG | 2019

NUTZUNGSEIGNUNG



BESONDERE STANDORTEIGNUNG



AUSSAATZEITRAUM

MITTLERE AUSSAATSTÄRKE | 270–320 KÖRNER/M²



ANBAUINDEX

	0	1	3	5	7	9	
Marktwareanteil	[Progress bar from 0 to 7]						+
Hektolitergewicht	[Progress bar from 0 to 8]						+
Standfestigkeit	[Progress bar from 0 to 6]						+
Ährenstabilität	[Progress bar from 0 to 7]						+
Winterhärte	keine Einstufung						

EINSTUFUNG IN ANLEHNUNG AN DIE BESCHREIBENDE SORTENLISTE

	+	1	2	3	4	5	6	7	8	9	-
Reife	[Green bars 1-5]					[Grey bars 6-9]				5	
Mehltau	[Green bars 1-4]				[Grey bars 5-9]					4	
Netzflecken	[Green bars 1-4]				[Grey bars 5-9]					4	
Rhynchosporium	[Green bars 1-4]				[Grey bars 5-9]					4	
Ramularia	[Green bars 1-5]					[Grey bars 6-9]				6	
Zwergrost	[Green bars 1-3]			[Grey bars 4-9]						3	

BESONDERHEITEN

GMV Typ 1 resistent
Auf Ramularia achten

SANDRA

SORTENPASS | WINTERGERSTE | ZWEIZEILIG
ZÜCHTER | VERTRIEB | IGP

TYP | BESTANDESDICHTETYP
ZULASSUNG | 2010

NUTZUNGSEIGNUNG



BESONDERE STANDORTEIGNUNG




AUSSAATZEITRAUM


MITTLERE AUSSAATSTÄRKE | 270–320 KÖRNER/M²



ANBAUINDEX



EINSTUFUNG IN ANLEHNUNG AN DIE BESCHREIBENDE SORTENLISTE



BESONDERHEITEN

GMV Typ 1 resistent
Auf Zwergrost und Ramularia achten

LEANDRA

SORTENPASS | WECHSELGERSTE | ZWEIZEILIG
ZÜCHTER | VERTRIEB | HS

TYP | KOMPENSATIONSTYP
ZULASSUNG | 2017

NUTZUNGSEIGNUNG



BESONDERE STANDORTEIGNUNG



AUSSAATZEITRAUM

MITTLERE AUSSAATSTÄRKE | 280–320 KÖRNER/M²



ANBAUINDEX

	0	1	3	5	7	9	
Marktwareanteil	[Progress bar from 0 to 7]						+
Hektolitergewicht	[Progress bar from 0 to 5]						+
Standfestigkeit	[Progress bar from 0 to 7]						+
Ährenstabilität	[Progress bar from 0 to 5]						+
Winterhärte	keine Einstufung						

EINSTUFUNG IN ANLEHNUNG AN DIE BESCHREIBENDE SORTENLISTE

	+	1	2	3	4	5	6	7	8	9	-	
Reife	[Green bars 1-5]											5
Mehltau	[Green bars 1-2]											2
Netzflecken	[Green bars 1-4]											4
Rhynchosporium	[Green bars 1-4]											4
Ramularia	[Green bars 1-5]											5
Zwergrost	[Green bars 1-3]											3

BESONDERHEITEN

Okt.-Nov.-Saateignung
Auf Ramularia achten